

# НЕЙРОНТИН®



СТАБИЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЬ  
НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ  
БОЛИ<sup>2-4</sup>

ПЕРВЫЙ  
ГАБАПЕНТИН<sup>1</sup>



УНИКАЛЬНО\*<sup>5,7</sup>



УДОБНО\*\*<sup>5</sup>



ДОСТУПНО<sup>6</sup>

#### КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НЕЙРОНТИН®

**Международное непатентованное название:** Габапентин. **Лекарственная форма:** капсулы и таблетки, покрытые пленочной оболочкой. **Фармакотерапевтическая группа:** противосудорожное средство. **Код АТХ:** N03AX12. **Показания к применению:** Нейропатическая боль. Лечение нейропатической боли у взрослых в возрасте 18 лет и старше. Эпилепсия. Монотерапия парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у взрослых и детей в возрасте 3 лет и старше. **Противопоказания:** Повышенная чувствительность к габапентину или вспомогательным компонентам препарата. Эпилепсия: Применение в качестве монотерапии парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у детей в возрасте до 12 лет. Применение в качестве дополнительного средства при лечении парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у детей в возрасте до 3 лет. **Нейропатическая боль:** Для лечения нейропатической боли у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. **Способ применения и дозы:** Нейронтин® назначают внутрь независимо от приема пищи. Если необходимо снизить дозу, поменять препарат или заменить его на альтернативное средство, это следует делать постепенно в течение минимум одной недели. Нейропатическая боль у взрослых. Начальная доза составляет 900 мг/сут в три приема равными дозами; при необходимости, в зависимости от эффекта, дозу постепенно увеличивают до максимальной — 3600 мг/сут. Лечение можно начинать сразу с дозы 900 мг/сут (по 300 мг 3 раза в сутки) или можно увеличивать дозу постепенно до 900 мг в сутки в течение первых 3 дней по следующей схеме: 1-й день: 300 мг препарата 1 раз в сутки; 2-й день: по 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день: по 300 мг 3 раза в сутки. Парциальные судороги. При эпилепсии обычно требуется длительное лечение. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: Эффективная доза — от 900 до 3600 мг/сут. Терапию можно начать с дозы 300 мг 3 раза в сутки в первый день или увеличивать постепенно до 900 мг по схеме: 1-й день: 300 мг препарата 1 раз в сутки; 2-й день: по 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день: по 300 мг 3 раза в сутки. В последующем доза может быть повышена максимально до 3600 мг/сут (разделенных на 3 равных приема). Дети в возрасте 3–12 лет: начальная доза препарата варьируется от 10 до 15 мг/кг/сут, которую назначают равными дозами 3 раза в день и повышают до эффективной приблизительно в течение 3 дней. Эффективная доза габапентина у детей в возрасте 5 лет и старше составляет 25–35 мг/кг/сут равными дозами в 3 приема. Эффективная доза габапентина у детей в возрасте от 3 до 5 лет составляет 40 мг/кг/сут равными дозами в 3 приема. Максимальный интервал между приемами доз препарата не должен превышать 12 часов во избежание возобновления судорог. **Побочное действие:** очень часто — вирусные инфекции, сонливость, головокружение, атаксия, утомляемость, лихорадка. Часто — пневмония, инфекции дыхательных путей, инфекция мочевыводящих путей, другие виды инфекции, средний отит, лейкопения, анорексия, повышение аппетита, враждебность, спутанность сознания, депрессия, беспокойство, нервозность, нарушение мышления, амноцидная лабильность, судороги, гиперемия, диарея, имбеция, тремор, бессонница, головная боль, нарушение чувствительности (например, парестезия, гипестезия), нарушение координации, инстинкты, усиление, ослабление или отсутствие рефлексов, нарушения зрения (такие как, амблиопия, диплопия), вертиго, симптомы вазодилатации, артериальная гипертензия, одышка, бронхит, фарингит, кашель, ринит, запор, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта или глотки, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота, боль в животе, заболевания зубов, гингивит, отек лица, пурпура (чаще всего её описывали как кровоподтёки, возникающие при физической травме), кожная сыпь, зуд, зуд кожи, малялия, артриты, боль в спине, покраснение лица, импотенция, периферические отеки, нарушение походки, астения, боль различной локализации, общее недомогание, гриппоподобный синдром, снижение концентрации лейкоцитов, повышение массы тела, травма, переломы, судороги, связанные с падением. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** возможно угнетение дыхания, симптомы седации и смерти, связанные с приёмом габапентина, при одновременном назначении с лекарственными препаратами, подавляющими ЦНС, включая опиоидные анальгетики. **Форма выпуска:** капсулы 100 мг и 300 мг и 400 мг. **Срок годности:** 3 года. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг и 300 мг. **Срок годности:** 2 года. **Условия отпуска:** по рецепту. **Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Нейронтин®:** П-№013567/01, П-№013567/02.



ООО «Пфайзер», 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,  
БЦ «Башня на набережной» (блок С)  
Тел.: +7 (495) 287 5000. Факс: +7 (495) 287 5300  
Служба медицинской информации Pfizer:  
Medinfo.Russia@Pfizer.com, www.pfizermedinfo.ru  
PP-SER-RUS-0554 26.02.2021

\* Нет аналогов габапентина для дозы 600 мг. \*\* Выпускается в виде капсул и делимых таблеток для удобства титрации и подбора терапии.  
1. URL: <https://www.drugs.com/neurontin.html>; дата доступа: 19.10.2020. 2. Kadri Yildirim, et al. The effectiveness of gabapentin in patients with chronic radiculopathy. The Pain Clinic. 2003; 15 (3): 213–218. 3. Rice AS, Maton S. Postherpetic Neuralgia Study Group. Gabapentin in postherpetic neuralgia: a randomised, double blind, placebo controlled study. Pain. 2001 Nov; 94 (2): 215–24. 3. Backonja M, et al. Gabapentin for the symptomatic treatment of painful neuropathy in patients with diabetes mellitus: a randomized controlled trial. JAMA. 1998 Dec 2; 280 (21): 1831–6. 5. Инструкция по медицинскому применению препарата Нейронтин®: П-№013567/01, П-№013567/02. 6. URL: <https://apteka.ru>; дата доступа: 19.10.2020. 7. IMS Global Data.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ