



ИНСУЛЬТ

ЧМТ

ДЕМЕНЦИЯ

## Препарат Церебролизин® в клинических рекомендациях EAN

Beghi, Ettore, et al. «Клинические рекомендации обществ Европейской академии неврологии и Европейской федерации специалистов в области нейрореабилитации относительно медикаментозной поддержки при ранней двигательной реабилитации после острого ишемического инсульта» European Journal of Neurology (2021).

- Высокие уровни достоверности доказательств и убедительности рекомендаций
- Убедительные результаты по всем показателям
- Доказанная безопасность

**Церебролизин®**  
ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ, ВОССОЕДИНЯЯ НЕЙРОНЫ

# Первые клинические рекомендации EAN по нейрореабилитации пациентов после инсульта



Получено: 3 апреля 2021 г. | Принято в печать: 17 мая 2021 г.

DOI: 10.1111/ene.14936

european journal  
of neurology  
the official journal of the european academy of neurology

## КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**Клинические рекомендации обществ Европейской академии неврологии и Европейской федерации специалистов в области нейрореабилитации относительно медикаментозной поддержки при ранней двигательной реабилитации после острого ишемического инсульта**

Ettore Beghi<sup>1</sup>  | Heinrich Binder<sup>2</sup> | Codruta Birle<sup>3</sup> | Natan Bornstein<sup>4</sup> | Karin Diserens<sup>5</sup> | Stanislav Groppa<sup>6</sup> | Volker Homberg<sup>7</sup> | Vitalie Lisnic<sup>8</sup> | Maura Pugliatti<sup>9</sup> | Gary Randall<sup>10</sup> | Leopold Saltuari<sup>11</sup> | Stefan Strliciu<sup>12</sup>  | Johannes Vester<sup>13</sup>



Целью данных клинических рекомендаций, основанных на доказательных данных, является поддержка процесса принятия **клинических решений** медицинскими специалистами, занимающимися восстановлением пациентов после инсульта.

Систематический обзор был выполнен в соответствии с рекомендациями, изложенными в методическом пособии «Предпочтительные параметры отчетности для систематических обзоров и мета-анализов» (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, **PRISMA**) и **Кокрейновском руководстве** по систематическим обзорам для медицинских процедур. Проект рекомендаций подготовлен с использованием принципов **GRADE**.

### **Церебролизин®**

(30 мл/сутки внутривенно, не менее 10 дней)

**рекомендован для клинического применения**

на ранних этапах нейрореабилитации после острого ишемического инсульта.



**Европейская академия неврологии (EAN)** – крупнейшее общество врачей-неврологов в мире, насчитывающее 45 000 экспертов

# Применение **Церебролизина** у пациентов после инсульта. Основные аргументы в пользу его выбора



**Высокие уровни достоверности доказательств и убедительности рекомендаций**

Результаты исследований CARS, ECOMPASS и мета-анализа Bornstein в клинических рекомендациях EAN признаны доказательствами высокого качества



**Убедительные результаты по всем показателям**

Отмечается благоприятное действие препарата **Церебролизин®** на восстановление моторной функции, общего неврологического статуса и показателей качества жизни



**Доказанная безопасность**

Не выявлено различий между контрольной группой и группой препарата **Церебролизин®** по частоте развития и характеру ТНЯ (тяжелых нежелательных явлений)



**Опубликованная в клинических рекомендациях EAN рекомендация О ПРИМЕНЕНИИ препарата **Церебролизин®**, включена в ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!**



**Доказательная база признана достаточной** для того, чтобы **рекомендовать применение препарата **Церебролизин®**** в умеренных и тяжелых случаях в качестве дополнения к стандартной реабилитации в первые 7 дней после инсульта...




# Рекомендованная схема применения препарата **Церебролизин®**



## Рекомендации по режиму дозирования

Нарушение	Суточная доза	Начало лечения	Продолжительность лечения
Инсульт	20–50 мл	как можно раньше	10–21 день



**Название:** Клинические рекомендации обществ Европейской академии неврологии и Европейской федерации специалистов в области нейрореабилитации относительно медикаментозной поддержки при ранней двигательной реабилитации после острого ишемического инсульта  
<https://doi.org/10.1111/ene.14936>

**Авторы:** E. Beghi et al.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА – Церебролизин® (Cerebrolysin®). РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N013827/01 Раствор для инъекций. СОСТАВ: 1 мл раствора содержит: действующее вещество: Церебролизин® концентрат (комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи) 215,2 мг; вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода для инъекций. ПОКАЗАНИЯ: болезнь Альцгеймера; синдром деменции различного генеза; хроническая цереброваскулярная недостаточность; ишемический инсульт; травматические повреждения головного и спинного мозга; задержка умственного развития у детей; гиперактивность и дефицит внимания у детей; в комплексной терапии – при эндогенной депрессии, резистентной к антидепрессантам. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: тяжелая почечная недостаточность; эпилептический статус; индивидуальная непереносимость препарата. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ применяют препарат при аллергических диатезах и заболеваниях эпилептического характера. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: применяется парентерально (внутримышечно, внутривенно (струйно, капельно)). Дозы и продолжительность лечения зависят от характера и тяжести заболевания, а также от возраста больного. Могут быть проведены повторные курсы. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: при чрезмерно быстром введении: редко – ощущение жара, потливость, головокружение и др.; очень редко: повышенная индивидуальная чувствительность, аллергические реакции и др. Полный перечень побочных эффектов указан в инструкции по медицинскому применению. УСЛОВИЯ ОТПУСКА: отпускают по рецепту. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ: ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ, Обербурггау 3, 4866 Унтерзах ам Аттерзее, Австрия.

Дополнительная информация о лекарственной форме, способе применения и дозах, особых указаниях и мерах предосторожности при применении, взаимодействии с другими лекарственными средствами и других видах взаимодействия, влиянии на фертильность, особенностях применения в период беременности и лактации, влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, нежелательных реакций, передозировке, фармакодинамических и фармакокинетических свойствах, сроке годности, особых мерах предосторожности при хранении, характере и содержании первичной упаковки приведены в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Церебролизин®.

За дополнительной информацией, с претензией на качество или сообщением о нежелательной реакции на препарат, пожалуйста, обращайтесь в офис компании ООО «ЭВЕР Нейро Фарма»: тел.: +7 (495) 933-87-02; e-mail: [drugsafety.ru@everpharma.com](mailto:drugsafety.ru@everpharma.com)



ООО «ЭВЕР Нейро Фарма»  
107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8  
Тел.: +7 (495) 933-87-02; факс: +7 (495) 933-87-15

[info-ru@everpharma.com](mailto:info-ru@everpharma.com)  
[www.everpharma.com](http://www.everpharma.com)  
[www.neurologic.ru](http://www.neurologic.ru)

Информация предназначена для специалистов здравоохранения. CERE/RUS/2021/08-008