



Симбикорт® Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза

противовоспалительный бронхолитик вместо бронхолитиков короткого действия для ВСЕХ степеней тяжести БА*¹⁻⁶

Клиническая эффективность:

- снижение риска тяжелых обострений и госпитализаций
 - **64%** при легкой БА^{1,2}
 - **39%** при среднетяжелой БА³
- начало бронхолитического действия через 1-3 минуты^{4,5}

*Только для дозировки 160/4,5 мкг, для взрослых и подростков 12 лет и старше. Выбор режима терапии осуществляется в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата и тяжестью заболевания. В случае применения Симбикорт® Турбухалер® 160/4,5 мкг/доза для купирования симптомов у пациентов со среднетяжелой и тяжелой БА, этот же препарат должен быть использован для базисной терапии⁴. 1. O'Burne et al. N Engl J Med 2018; 378:1865-76. 2. Bateman ED et al. Article and supplementary appendix. N Engl J Med. 2018;378:1877-1887. 3. Kuna P et al. Int J Clin Pract. 2007;61:725-736. 4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Симбикорт® Турбухалер® 80/4,5 мкг/доза, 160/4,5 мкг/доза (порошок для ингаляций дозированный) с учетом изменений №1,2,3. Регистрационное удостоверение П N013167/01 от 28.09.2011 (непереформлено 12.08.2021). <https://www.az-most.ru/content/dam/multibrand/ru/ru/pdf/Symbicort%20TBH-Leaflet-80mcg160mcg-RU-V1.pdf>. 5. Seborova E. and Andersson a. Respir Med 2000, 94(6):607-611. 6. Lipworth BJ. Arch Intern Med 1999;159:941-55. Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата. ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», Россия 123112 Москва, 1-й Красногвардейский проезд дом 21. стр. 1. Тел: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98 www.astrazeneca.ru. SYM RU-11500. Дата одобрения: 07.10.2021. Дата истечения: 06.10.2023.

Симбикорт®
будесонид/формотерол

AstraZeneca 