

# НЕЙРОНТИН®

СТАБИЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЬ  
НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ  
БОЛИ<sup>2-4</sup>



ПЕРВЫЙ  
ГАБАПЕНТИН<sup>1</sup>



УНИКАЛЬНО\*<sup>5,7</sup>



УДОБНО\*\*<sup>5</sup>



ДОСТУПНО<sup>6</sup>

Международное непатентованное название: Габапентин. Лекарственная форма: капсулы и таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Фармакотерапевтическая группа: противоэpileптическое средство. Код АТХ: N03AX12. Показания к применению: Нейропатическая боль. Лечение нейропатической боли у взрослых в возрасте 18 лет и старше. Эпилепсия. Монотерапия парциальных судорог с вторичной генерализацией и без нее у взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше. Как дополнительное средство при лечении парциальных судорог с вторичной генерализацией и без нее у взрослых и детей в возрасте 3 лет и старше. Противопоказания: Повышенная чувствительность к габапентину или вспомогательным компонентам препарата. Эпилепсия. Применение в качестве монотерапии парциальных судорог с вторичной генерализацией и без нее у детей в возрасте до 12 лет. Применение в качестве дополнительного средства при лечении парциальных судорог с вторичной генерализацией и без нее у детей в возрасте до 3 лет; Нейропатическая боль. Для лечения нейропатической боли у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Способ применения и дозы: Нейронтин® назначают внутрь независимо от приема пищи. Если необходимо снизить дозу, отменить препарат или заменить его на альтернативное средство, это следует делать постепенно в течение минимум одной недели. Нейропатическая боль у взрослых. Начальная доза составляет 900 мг/сут в три приема равными дозами; при необходимости, в зависимости от эффекта, дозу постепенно увеличивают до максимальной — 3600 мг/сут. Лечение можно начинать сразу с дозы 900 мг/сут (по 300 мг 3 раза в сутки) или можно увеличивать дозу постепенно до 900 мг в сутки в течение первых 3-х дней по следующей схеме: 1-й день: 300 мг препарата 1 раз в сутки; 2-й день: по 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день: по 300 мг 3 раза в сутки. Парциальные судороги. Начальная доза составляет 300 мг препарата 1 раз в сутки; 2-й день: по 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день: по 300 мг 3 раза в сутки. В последующем дозу можно быть повышена максимально до 3600 мг/сут (разделенная на 3 равных приема). Дети в возрасте 3-12 лет: начальная доза препарата варьирует от 10 до 15 мг/кг/сут, которую назначают равными дозами 3 раза в день и повышают до эффективной приблизительно в течение 3-х дней. Эффективная доза габапентина у детей в возрасте 5 лет и старше составляет 25-35 мг/кг/сут равными дозами в 3 приема. Эффективная доза габапентина у детей в возрасте от 3-х до 5 лет составляет 40 мг/кг/сут равными дозами в 3 приема. Максимальный интервал между приемом доз препарата не должен превышать 12 часов во избежание возобновления судорог. Побочное действие: очень часто — вирусные инфекции, сонливость, головокружение, атаксия, утомляемость, лихорадка. Часто — линемония, инфекция дыхательных путей, инфекция мочевыводящих путей, другие виды инфекции, средний отит, лейкопения, анорексия, повышение аппетита, враждебность, спутанность сознания, депрессия, беспокойство, нервозность, нарушение мышления, эмоциональная лабильность, судороги, гиперемия, диаррея, анемия, тремор, бессонница, головная боль, нарушение чувствительности (например, парестезия, гипестезия), нарушение координации, инсталли, усиление, ослабление или отсутствие рефлексов, нарушение зрения (также как амблиопия, диплопия), вертиго, симптомы вазодилатации, артериальная гипотензия, одышка, бронхит, фарингит, кашель, ринит, запор, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта или глотки, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота, боль в животе, заболевания зубов, гингивит, отек лица, пурпура (чаще всего ее описывали как кровоизлияние, возникающее при физической травме), кожная сыпь, акне, зуд кожи, миалгия, артралгия, боль в спине, подергивания мышц, имплантация, периферические отеки, нарушение походки, астеня, боль различной локализации, общее недомогание, гриппоподобный синдром, снижение концентрации лейкоцитов, повышение массы тела, травмы, переломы, судороги, связанные с параличом. Форма выпуска: капсулы 100 мг, 300 мг и 400 мг. Срок годности: 3 года. Условия отпуска: по рецепту. Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Нейронтин® П N013567/01, П N013567/02.



ООО «Пфайзер» 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,  
БЦ «Башня на Набережной» (блок С)  
Тел.: +7 (495) 287 5000. Факс: +7 (495) 287 5300  
Служба медицинской информации Pfizer:  
Medinfo.Russia@Pfizer.com, www.pfizermedinfo.ru  
PP-MEU-RUS-0133 29.01.2021

\* Нет аналогов габапентина для дозы 600 мг. \*\* Выпускается в виде капсул и делимых таблеток для удобства титрации и подбора терапии.

1. <https://www.drugs.com/neurontin.html>, доступно 19.10.2020. 2. Kadji Yildirim et al. (2003) The effectiveness of gabapentin in patients with chronic radiculopathy. The Pain Clinic, 15(3): 213-218. 3. Rice AS, Malton S. Therapeutic Neuralgia Study Group. Gabapentin in postherpetic neuralgia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Pain, 2001 Nov;94(2):215-24. 3. Backonja M et al. Gabapentin for the symptomatic treatment of painful neuropathy in patients with diabetes mellitus: a randomized controlled trial. JAMA, 1998 Dec 2; 280(21):1831-6. 5. Инструкция по медицинскому применению препарата Нейронтин® П N013567/01, П N013567/02. 6. <https://apleka.ru>, доступно 19.10.2020. 7. IMS Global Data.

