



ЛП-№(002445)-(P)-RU

## ОРИГИНАЛЬНЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ\* АНКСИОЛИТИК С ТРОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ:

- ПРОТИВОТРЕВОЖНОЕ
- АНТИАСТЕНИЧЕСКОЕ
- МЯГКОЕ АНТИДЕПРЕССИВНОЕ

### СХЕМА НАЗНАЧЕНИЯ АВИАНДРА




\*По действующему веществу.  
URL: <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx> на 23.10.2023.



20 мг · утро



20 мг · вечер



## ВЫДЕРЖКА ИЗ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА<sup>1</sup>

**АВИАНДР**, 20 мг, таблетки, покрытые плёночной оболочкой.

**Действующее вещество:** 2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-*b*] индола гидрохлорид.



**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые плёночной оболочкой.

**Показания к применению** у взрослых старше 18 лет для лечения: генерализованного тревожного расстройства; при тревожных состояниях после перенесённой коронавирусной инфекции (COVID-19); у пациентов со стрессовой реакцией и нарушением адаптации лёгкой и средней степени выраженности.

**Способ применения:** применяется внутрь, за 30 минут до еды. Таблетку следует проглатывать целиком, не разжёвывая. Лечение генерализованного тревожного расстройства: внутрь по 1 таблетке (20 мг) 2 раза в сутки (утром и вечером). Поскольку генерализованное тревожное расстройство является заболеванием с хроническим течением, продолжительность лечения определяется врачом. Лечение тревожных состояний, в том числе после перенесённой коронавирусной инфекции (COVID-19); у пациентов с ведущей жалобой на тревогу, изменение фона настроения, вспыльчивость и раздражительность; у пациентов со стрессовой реакцией и нарушением адаптации лёгкой и средней степени выраженности: внутрь по 1 таблетке (20 мг) 2 раза в сутки (утром и вечером). Длительность курсового применения препарата составляет 4 недели. При необходимости, в зависимости от состояния пациента, длительность лечения может быть увеличена до 6 недель. В случае прекращения лечения нет необходимости в постепенном снижении дозы.

**Противопоказания:** гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ; эпилепсия и органические заболевания головного мозга; приём одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) и в течение 2 недель после их отмены; почечная недостаточность средней и тяжёлой степени (СКФ <60 мл/мин); печёночная недостаточность лёгкой, средней и тяжёлой степени (класс А, В и С по классификации Чайлда – Пью).

**За подробной информацией обращайтесь к общей характеристике лекарственного препарата.**

1. URL: <https://iclinic.pro/publications/articles/aviandr-unikalnyy-anksiolitik-s-troynym-deystviem/>.

**ЗАО «ФармФирма «Сотекс»**

115201, Москва, Каширское ш., д. 22, корп. 4, стр. 7

Тел.: +7 495 231-15-12; факс: +7 495 231-1509

[www.sotex.ru](http://www.sotex.ru)

