



THERAPEUTICS

Лучшие решения для пациентов.

**ЧТОБЫ ВАШ ПАЦИЕНТ
СНОВА МОГ ОБНЯТЬ
СВОЮ СЕМЬЮ**

 **Ксеомин®**
Ботулинический токсин типа А
ДОСТИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЦЕЛИ

НОВОЕ ПОКАЗАНИЕ: спастичность верхней конечности у взрослых¹

**Ксеомин показан пациентам со спастичностью
верхней конечности, независимо от нозологии¹**

**Ксеомин разрешен к применению в дозе
до 250 ЕД для коррекции спастичности пяти
мышц плеча¹**

**Суммарная доза для мышц верхних конечностей:
до 500 ЕД¹**

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ксеомин®.

Ксеомин®. Регистрационное удостоверение: NO ЛСП-004746/08.

Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения. Ксеомин представляет собой ботулинический токсин, продуцируемый штаммом бактерии Clostridium botulinum типа А, освобожденный от комплексообразующих белков.

Состав (1 флакон): ботулинический токсин типа А — 50 ЕД или 100 ЕД; сахароза — 4,7 мг; сывороточный альбумин человека — 1,0 мг.

Описание: лиофилизат белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: периферический миорелаксант.

Показания к применению: блефароспазм и гемифациальный спазм, идиопатическая цервикальная дистония (спастическая кривошея) преимущественно ротационной формы, спастичность верхней конечности у взрослых, спастичность верхней и нижней конечностей у детей в возрасте от 2 до 18 лет, хроническая сиалорея у взрослых, хроническая сиалорея у пациентов от 2 до 18 лет, гиперкинетические складки (мимические морщины) лица.

Противопоказания: препарат противопоказан людям с аллергией к компонентам препарата, при нарушениях нервно-мышечной передачи.

Препарат не вводят при повышенной температуре и острых инфекционных или неинфекционных заболеваниях. Препарат противопоказан при беременности и лактации.

Побочное действие: в редких случаях возможны побочные реакции в виде птоза, сухости глаз, дисфагии, мышечной слабости, головной боли, нарушения чувствительности, которые полностью обратимы и имеют временный характер.

Условия хранения и транспортирования: при комнатной температуре (не выше 25 °С).

Срок годности: 3 года.

Условия отпуска: по рецепту.

Производитель: «Мерц Фарма ГмБХ и Ко.КГаА» D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне.

ООО «Мерц Фарма». 123112, Москва, Пресненская наб., 10, блок С «Башня на набережной». Тел: (495) 653 8 555, факс: (495) 653 8 554

Данная информация представлена ООО «Мерц Фарма» в качестве информационной поддержки специалистов здравоохранения.

Перед назначением препаратов, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению.

Все права защищены.