

# Я Геннадий

У МЕНЯ ЕСТЬ ЦЕЛИ.  
У МЕНЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЯ.  
ПОМОГИТЕ МНЕ ДОСТИЧЬ ИХ.

Геннадий, 79 лет, пациент с сиалореей

Ксеомин® показан для лечения взрослых пациентов с хронической сиалореей вследствие неврологических расстройств



## РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУММАРНАЯ ДОЗА\*

ЖЕЛЕЗА(Ы)	ДОЗА НА СТОРОНУ	СУММАРНО
Околоушная(ые) железа(ы)	30 ЕД	60 ЕД
Подчелюстная(ые) железа(ы)	20 ЕД	40 ЕД
Всего	50 ЕД	100 ЕД

\*<https://grls.rosminzdrav.ru>

\*Время повторной инъекции определяется индивидуально для каждого пациента на основе клинической картины, но не раньше чем через 16 недель.

О нежелательных явлениях следует сообщать в ООО «Мерц Фарма», 123112, Москва, Россия, Пресненская набережная 10, блок С  
Тел. +7 (495) 653 8 555

## Ксеомин®

Регистрационное удостоверение: № ЛСР-004746/08.

**Лекарственная форма:** лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения. Ксеомин представляет собой ботулинический токсин, продуцируемый штаммом бактерии *Clostridium botulinum* типа А, освобожденный от комплексообразующих белков.

**Состав (1 флакон):** ботулинический токсин типа А – 50 ЕД или 100 ЕД; сахароза – 4,7 мг; сывороточный альбумин человека – 1,0 мг.

**Описание:** лиофилизат белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** периферический миорелаксант.

**Показания к применению:** блефароспазм, идиопатическая цервикальная дистония (спастическая кривошея) преимущественно ротационной формы, спастичность верхней конечности после инсульта у взрослых, спастическая эквинусная и эквиноварусная деформация стопы при детском церебральном параличе у детей в возрасте от 2 до 18 лет, хроническая сиалорея у взрослых, хроническая сиалорея у пациентов от 2 до 18 лет, гиперкинетические складки (мимические морщины) лица.

**Ксеомин эффективен и хорошо переносится при использовании интервалов между инъекциями от 6 до 20 недель (медиана: 12 недель).**

123112, Москва, Россия, Пресненская набережная 10, блок С, ООО «Мерц Фарма»  
Тел. +7 (495) 653 8 555

Данная информация предоставлена компанией Мерц в качестве информационной поддержки специалистам здравоохранения.

Перед назначением и использованием упомянутого препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной утвержденной инструкцией по применению.

**Интервалы между инъекциями должны определяться на основе индивидуальной потребности пациента.**

**Противопоказания:** препарат противопоказан людям с аллергией к компонентам препарата, при нарушениях нервно-мышечной передачи. Препарат не вводят при повышенной температуре и острых инфекционных или неинфекционных заболеваниях. Препарат противопоказан при беременности и лактации.

**Побочное действие:** в редких случаях возможны побочные реакции в виде птоза, сухости глаз, дисфагии, мышечной слабости, головной боли, нарушения чувствительности, которые полностью обратимы и имеют временный характер.

**Условия хранения и транспортирования:** при комнатной температуре (не выше 25 °С).

**Срок годности:** 3 года.

**Условия отпуска:** по рецепту.

**Производитель:** «Мерц Фарма ГмБХ и Ко.КГаА». D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне.