

# Ингасалин®


ПРИ КАШЛЕ,

ВКЛЮЧАЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ПАЦИЕНТОВ<sup>3</sup>

> Гиалуроновая кислота

> Соль NaCl



**Ингаляционный способ применения 2 раза в день – «золотой стандарт» лечения заболеваний дыхательной системы<sup>4</sup>**

Благоприятный профиль безопасности, рекомендован к применению **с 0 лет<sup>3</sup>**

ТРОЙНОЙ МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ПАТОГЕНЕЗ КАШЛЯ:

- 1 МУКОЛИТИЧЕСКИЙ<sup>1</sup>**  
разжижает мокроту
- 2 МУКОКИНЕТИЧЕСКИЙ<sup>2</sup>**  
выводит мокроту
- 3 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ<sup>2</sup>**  
защищает ткань легких

ООО «ГРОТЕКС»

196279, Россия, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 71, лит. А, тел.: +7 812 385 47 87, [www.solopharm.com](http://www.solopharm.com)

Перейти на сайт препарата [www.ingasalin.ru](http://www.ingasalin.ru)



1. Кондратьева Е.И., Шерман В.Д., Шадрина В.В. Гипертонический раствор в терапии больных муковисцидозом в Российской Федерации. Медицинский совет. 2021;(16):128–137. <https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-16>

2. Согласно инструкции по применению Ингасалин® ПЭН №2018/7618

3. Zhang L, Mancuso-Sassi RA, Wainwright C, Klassen TP. Nebulized hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: 4.CD006458. DOI: 10.1002/14651858.CD006458.pub4.

4. Мальхин Ф.Т., Визель А.А., Визель И.Ю. Применение мукоактивных лекарственных средств в практике терапевта. Архивъ внутренней медицины. 2013;(5):10-5.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ<sup>2</sup>