



# ПОМОГАЯ ПАЦИЕНТАМ ДОСТИЧЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ



## Ксеомин® (ботулинический токсин типа А)<sup>1</sup>

- Быстрый и продолжительный эффект<sup>2,3</sup>
- Долгосрочная эффективность терапии<sup>4</sup>
- Температура хранения до 25 °С – удобно хранить и перевозить<sup>1</sup>

1. Инструкция по применению препарата Ксеомин®. 2. Kaňovský P, et al. Front Neurol. 2021;11:615706. doi: 10.3389/fneur.2020.615706.

3. Marvulli R, et al. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2023;22(6):916-923. doi: 10.2174/1871527321666220630154404. 4. Hefter H, et al. J Neurol. 2023;270(2):788-796. doi: 10.1007/s00415-022-11395-2.

**Краткая инструкция по препарату Ксеомин®. Регистрационное удостоверение:** № ЛСР-004746/08. **Лекарственная форма:** лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения. Ксеомин® представляет собой ботулинический токсин, продуцируемый штаммом бактерии *Clostridium botulinum* типа А, освобожденный от комплексообразующих белков. **Состав (1 флакон):** ботулинический токсин типа А – 50 ЕД или 100 ЕД; сахара – 4,7 мг; сывороточный альбумин человека – 1,0 мг. **Описание:** лиофилизат белого цвета. **Фармакотерапевтическая группа:** периферический миорелаксант.

### Показания к применению:

- блефароспазм и гемифациальный спазм;
- идиопатическая цервикальная дистония (спастическая кривошея) преимущественно ротационной формы;
- спастичность верхней конечности и спастичность нижней конечности с поражением голеностопного сустава у взрослых;
- спастичность верхней и нижней конечностей у детей в возрасте от 2 до 18 лет;
- хроническая сиалорея у взрослых;
- хроническая сиалорея у детей в возрасте от 2 до 18 лет;
- гиперкинетические складки (мимические морщины) лица.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушения нервно-мышечной передачи, наличие инфекции и воспалительного процесса в местах инъекций, детский возраст до 2 лет (при показаниях спастичность верхней и нижней конечностей у детей, хроническая сиалорея у детей), до 18 лет – по остальным показаниям (эффективность и безопасность применения не определены). **Побочное действие:** в редких случаях возможны побочные реакции в виде птоза, сухости глаз, дисфагии, мышечной слабости, головной боли, нарушения чувствительности, которые полностью обратимы и имеют временный характер. **Условия хранения и транспортирования:** при комнатной температуре (не выше 25 °С). **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** по рецепту. **Производитель/организация, принимающая претензии:** ООО «Мерц Фарма», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Башня на Набережной, блок С, телефон: (495) 653-8555, факс: (495) 653-8554, www.merz.ru.

**Производитель (выпускающий контроль качества):** «Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА», Германия. Юридический адрес: 60318 Франкфурт-на-Майне, Экенхаймер Ландштрассе 100. Фактический адрес: 64354 Райнхайм, Людвигштрассе 22.

Данная информация представлена ООО «Мерц Фарма» в качестве информационной поддержки специалистов здравоохранения.

Информация, относящаяся к какому-либо лекарственному препарату, может не соответствовать инструкции по применению. Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению.

Все права защищены.



НОВЫЕ ПОКАЗАНИЯ\*