

Чтобы дальше
сохранять
воспоминания



оригинальный

Акатинол*

для лечения сосудистой деменции
и деменции при болезни Альцгеймера¹

☞ Доказано исследованиями

☞ Проверено временем

Акатинол способствует улучшению
состояния пациента при:

- когнитивных нарушениях²
- снижении повседневной активности³
- поведенческих расстройствах⁴
- проблемах общения⁵



1. Инструкции по медицинскому применению препарата Акатинол Мемантин. 2. Pomara N, et al. J Alzheimer Dis Assoc Dis. 2007;21(1):60-64. 3. Winblad B, et al. J Nutr Health Aging. 2010;14(9):770-774. 4. Kishi T, et al. Neuropsych Dis Treat. 2017;13:1909-1928. 5. Saxton J, et al. J Alzheimers Dis. 2012;28(1):109-118.

* Торговое название: Акатинол Мемантин. МНН: мемантин. Регистрационные номера: П N014961/01, ЛП-000652.

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Акатинол

Показания к применению: деменция альцгеймеровского типа, сосудистая деменция, смешанная деменция всех степеней тяжести (ИМП П N014961/01, Акатинол Мемантин 10 мг). Деменция средней и тяжелой степени выраженности при болезни Альцгеймера, умеренно выраженная и умеренно тяжелая сосудистая деменция (ИМП ЛП-000652, Акатинол Мемантин 20 мг). Противопоказания согласно ИМП ЛП Акатинол Мемантин 10 мг: индивидуальная повышенная чувствительность к препарату, выраженные нарушения функции почек, беременность, грудное вскармливание, дети до 18 лет (в связи с недостаточностью данных). Противопоказания согласно ИМП ЛП Акатинол Мемантин 20 мг: индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая печеночная недостаточность, дети до 18 лет (в связи с недостаточностью данных по безопасности и эффективности). Способ применения и дозы согласно ИМП ЛП Акатинол Мемантин 20 мг: назначают в течение 1-й недели терапии в дозе 5 мг/сут, в течение 2-й недели – в дозе 10 мг/сут, в течение 3-й недели – в дозе 15 мг/сут, начиная с 4-й недели – 20 мг/сут. Способ применения и дозы согласно ИМП ЛП Акатинол Мемантин 10 мг: 1 неделя – 5 мг/сут, 2 неделя – 10 мг/сут, 3 неделя – 15-20 мг/сут. Побочное действие: часто встречаются: головная боль, сонливость, одышка, запор, головокружение, гиперчувствительность к компонентам препарата, повышение артериального давления, повышение биохимических показателей функции печени, нарушение равновесия. Форма выпуска: таблетки 10 мг – №30, 90; таблетки 20 мг – №28, 56, 98. Производитель: «Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА», 60318, Германия, Франкфурт-на-Майне. Полная информация о препарате – в инструкции по медицинскому применению.



ООО «Мерц Фарма»: 123112, Москва, Пресненская наб., 10,
блок С «Башня на набережной».
Тел.: (495) 653 8 555, Факс: (495) 653 8 554
www.merz.ru

Merz-2426422 от 15.05.2024

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ